

Fluorure diamine d'argent (FDA)

« Silver Diamine Fluoride (SDF) »

Instructions:

- Faire signer le consentement
- Nettoyer la plaque et les débris en surface avec une micro-brossette
- Rincer et retirer l'excédent de salive avec la pompe à salive
- Optionnel: appliquer de la vaseline sur les tissus mous à proximités de la/les lésion(s) à traiter à l'aide d'un écouvillon
 - Si le produit touche accidentellement les tissus mous, une coloration peut apparaître. Elle disparaîtra naturellement dans les 1-3 jours suivants (fig.2-3)
- Isoler la/les dents à traiter à l'aide de rouleaux de coton
- Bien sécher la/les lésion(s) à traiter
- Déposer une goutte de FDA dans un godet en plastique jetable
- Appliquer le FDA à l'aide d'une micro-brossette sur la/les lésions désiré(es)
- Laisser le produit reposer pendant 1 minute à l'air libre
- Optionnel: appliquer une couche de vernis fluoré par-dessus pour masquer le goût métallique
 - Le goût métallique se dissipe rapidement dans les jours suivants même sans application de vernis fluoré
- Ré-évaluer après 7 jours et ré-appliquer au besoin en suivant les étapes
 - Si la lésion carieuse n'est toujours pas arrêtée, jusqu'à 3 applications de FDA sont possible à l'intérieur d'un mois
- Ré-évaluer et ré-appliquer si nécessaire aux 6 mois (2x/année)
- Peut être restauré avec du verre ionomère au besoin



Fig.1 Lésion carieuse pré-op



Fig.2 Immédiatement après application



Fig.3 Une semaine post-op